

Fünftes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz, Altstadt, Mittergasse No. 539 zum Tausch oder Kauf*) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingungen vorrätzig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegenseudungen verhältnißmäßige Geldvorschüsse erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 fr. C. M.

Poterium agrimonifolium. Cav. (Walter) — *Sanguisorba*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Prenanthes purpurea*. L. (Slawětín. Eisenstein. Dresden Bauer.) — *Primula elatior columnae*. Tenor. (Prag. Eisenstein.) — *acaulis*. L. (Brühl. Eyb.) — *farinosa*. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — *Veris*. L. (St. Prokop. Opiz. Prag. Eisenstein.) — *Prunella grandiflora foliis pinnatifidis*. (Mainz. Ziz.) — *grandiflora*. L. (Prag. Kostelecky.) — *laciniata*. L. (Prag. Kostelecky.) — *vulgaris*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Prunus armeniaca*. L. (Mann.) — *chamaecerasus*. Jacq. (Podbaba. Opiz. Kostelecky.) — *Mahaleb*. L. (Chotek. Maly.) — *pygmaea*. W. (Walter.) — *Cerasus*. L. (Chotek.) — *domestica*. Linne. (Kostelecky.) — *Padus*. L. (Krazau. Petters. Baumgarten. Eisenstein.) — *serotina*. Ehrh. (Mann) — *Pteris serrulata*. (Sehlmeyer) — *aquilina*. L. (Krummau. Jungbauer. Böhmischaicha. Prochaska.) — *Puccinia Polygoni*. (Kaiserwiese. Benesch.) — *cylindrica*. ^{1 2}) Opiz. (Seßinsfel. Opiz.) — *bulbosa*. (auf *Rubus fruticosus*. Opiz.) — *Rosae*. (Dassic. Mann.) — *obtusa*. (Podbaba. Benesch.) — *striola*. (auf *Arundo Phragmites*. Ramisch. Opiz.) — *Anemones*. (Weihe.) — *graminis*. (Prag. Mann.) — *Laburni*. (Baumgarten. Ramisch.) — *Circaeae*. (Gerhard.)

*) Die Centurie à 4 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

^{1 2}) *P. nigra*, sporidiis cylindraceis, ecaudatis, *septemmannulatis*. Opiz. An Gräsern. Darf nicht mit *P. graminis* verwechselt werden, denn da wird definiert: *sporulis subturbinatis, medio constrictis*. Opiz. fl. crypt. Boëm. fasc. VII. n. 173.

— mucronata. (Leipzig. Reichenbach.) — Clinopodii. (Leipzig. Reichenbach.) — verrucosa. (Reichenbach.) — Prunispinosae. (Leipzig. Reichenbach.) — *Pulmonaria officinalis*. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Pulsatilla alpina*. (Sudeten. Mann.) — pratensis. (Podbaba. Opiz. Türkenchanze. Kerndel.) — Lausitz. Burckhard.) — *Pyrethrum corymbosum*. (Ruchelbad. Eisenstein.) — *Pyrola chlorantha*. Swarz. (Schlesien. Grabowsky.) — rotundifolia. Linn. (Gemnisch. Chotek.) — secunda. L. (Freuenberg. Petters. Meinerz. Uechtriz.) — uniflora. L. (Krumm. Jungbauer. Blanitz. Eisenstein. Hainzdorf. Petters.) — *Pyrus prunifolia*. W. (Walter) — baccata. L. (Maly.) — Amelanchier. Linn. (Salzburg. Hinterhuber.) — ovalis. Willd. (Maly.) — *Quercus Robur*. Willd. (St. Prokop Eisenstein.) — Robur crispa. Bechstein. (Bitzberg. Benesch.) — pubescens Willd. (Prag. Kosteletzky.) — *Racodium cellare*. (Weinfässer in Krumm. Jungbauer.) — *Radiola millegrana*. Smith. (Böheim. Mann.) — *Ramalina pollinaria humilis*. Achar. (auf Pinus in Böheim. Mann.) — fraxinea. (Prag. Mann.) — *Ranunculus abortivus*. L. (Weihe.) — aconitifolius. L. (Riesengebirg. Eisenstein. Palliardi.) — aquatilis. L. (Prag. Kosteletzky.) — aquatilis capillaceus. Desf. (Runersdorf. Walter.) — aquatilis heterophyllus. Hoffm. (Blatnj. Moschner.) — aquatilis minor. (Grätz. Gebhard.) — auricomus apetalus. (Prag. Mann.) — nemorosus. De C. (Kaiserslautern. Koch.) — repens flore pleno. (Masner. Wawak.) — acris. L. (Prag. Eisenstein.) — alpestris. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — arvensis. L. (Prag. Kosteletzky.) — auricomus. L. (Prag. Kosteletzky.) — bulbosus. L. (Prag. Kosteletzky.) — flammula. L. (Prag. Kosteletzky.) — fluviatilis. (Prag. Kosteletzky.) — montanus. Willd. (Mariageß. Hölzel.) — Philonotis. Rez. (Minden. Weihe.) — repens. L. (Slawětín. Eisenstein.) — sceleratus. L. (Prag. Mann.) — Thora. L. (Detscher. Hölzel.) — parviflorus. L. (Kosteletzky.) — nivalis. L. (Glänzf. Hinterhuber.) — *Raphanus sativus chinensis*. P. (Kosteletzky.) — *Raphanistrum*. L. (Böhmischa. Prochaska.) — sativus. L. (Mann.) — *R. seda lutea*. L. (Prag. Kosteletzky.) — luteola. L. (Ru-

ſelbad. Mann. Prag. Kostelecky.) — *Phyteuma*, Linn. (Fenneg. Wierzbicki.) — *odorata*, Linn. (Stöckl. Mann.) — *Rhagadiolus stellatus*, Gärtn. (Kostelecky.) — *Rhamnus cathartica*, L. (Prag. Kostelecky.) — *Frangula*, L. (Žižfaberg. Opiz.) — *Rhinanthus villosus*, Pers. (Stern. Eisenstein. Prag. Moschner.) — *angustifolius*, Gmel. bad. (Runersdorf. Walter. Prag. Kostelecky.) — *Crista galli*, L. (Prag. Kostelecky.) — *Rhizomorpha setiformis*, (Jäschfenberg. Benesch.) — *Rhododendron chamaecistus*, L. (Untersberg. Hinterhuber.) — *hirsutum*, L. (Salzburg. Hinterhuber.) — *Rhus Toxicodendron vulgare*, Mich. (Mann.) — *typhinum*, L. (Mann.) — *Rhynchospora alba*, Schrad. (Friedland, Bullendorf. Petters.) — *Ribes alpinum*, L. (Prag. Opiz.) — *nigrum*, L. (Petters.) — *uvacrispa*, L. (Prag. Moschner.) — *floridum*, Herit. (Günther.) — *Rivina humilis*, L. (Hentschel.) — *Robinia Pseudacacia*, L. (Mann.) — *viscosa*, Vent. (Chotek.) — *Röstelia cancellata*, (Prag. Opiz.) — *Ariae*, Opiz. (St. Profop. Opiz.) — *Rosa alba fl. pleno* (Mann. Masner.) — *cinnamomea fl. pleno*, (Mann. Masner.) — *eglanteria*, L. (Formanek.) — Prag. Mann.) — *eglanteria bicolor*, Jacq. (Adamowsky.) — *Kluckii*, (Schlesien. Grabowsky.) — *pendulina*, L. (Weihe.) — *pyrenaica*, Gouan. (Mann. Maly.) — *turbinata fl. pleno*, (Mann.) — *alba*, L. (Maly.) — *cinnamomea*, Desv. (Misch. Formanek.) — *villosa*, L. (Laufz. Burckhard.) — *turbinata*, Aiton. (Kostelecky.) — *semperflorens*, Curt. (Masner.) — *carolina*, L. (Walter.) — *mollis*, Presl. (Suban. Maly.) — *Rubia tinctorum*, L. (Opiz.) — *Rubigo Padi*, Martius. (Krumm. Jungbauer.) — *Rubus caesius palustris*, Weihe. (Prag. Kostelecky. Masner.) — *Pseudocae-sius*, Weihe. (Weihe.) — *caesius*, L. (Weihe.) — *odoratus*, L. (Klima.) — *nitidus*, (Minden. Weihe.) — *praecox fastigiatus*, (Minden. Weihe.) — *praecox plicatus*, (Weihe.) — *Rudbeckia amplexifolia*, Jacq. (Maly.) — *hirta*, L. (Hentschel.) — *laciniata*, L. (Chotek.) — *pinnata*, Vent. (Chotek.) — *digitata*, Miller. (Chotek.) — *Rumex acetosella lobata*, (Rezi. Wierzbicki.) — *digynus*, L. (Admont. Sommerauer.) — *Acetosa*, L. (Prag. Kostelecky.) — *Acetosella*, L. (Prag. Kostelecky.)

— *scutatus*. L. (Prag. Praesens.) — *Ruscus Hypoglossum*. L. (Petters. Kosteletzky.) — *Ruta officinalis*. (Speckmoser.) — *gravcolens*. L. (Kosteletzky.) — *chalepensis*. L. (Günther.) — *Sagittaria sagittifolia*. L. (Prag. Mann.) — *Salix arenaria*. L. (Mariazell. Hölzel.) — *nigricans latifolia*. Seringe. (Günther.) — *skiaphila*. Tausch. (Prag. Maly.) — *stylosa*. Seringe. (Schlesien. Grabowsky.) — *Hoppeana*. Willd. (Salzburg. Hinterhuber.) — *bicolor*. Ehrh. (Maly.) — *babylonica*. L. (Maly. Masner.) — *purpurea*. L. (Prag. Maly. Grätz. Speckmoser.) — *repens*. L. (Schlesien. Grabowsky.) — *retusa*. L. (Schneeberg. Praesens.) — *triandra*. L. (Seßinsfel. Opiz.) — *vininalis*. L. (Seßinsfel. Opiz.) — *Wulfeniana*. Willd. (Guggenthal. Hinterhuber.) — *stipularis*. Smith. (Günther.) — *amygdalina*. L. (Prag. Maly.) — *pomeranica*. (Günther.) — *grandifolia*. De C. (Baně. Maly.) — *pratensis*. Scopoli. (Strahlhofftic. Obst.) — *Salsola Tragus* L. (Gastorf. Neumann.) — *laniflora*. L. fil. (Hentschel.) — *Salvia caesia*. H. et B. (Walter.) — *glutinosa*. L. (Geisberg. Hinterhuber. Wilh. ring. Jungbauer.) — *Horminum*. L. (Hentschel.) — *pendula*. (Walter.) — *rugosa*. Thunb. (Mann.) — *Sclarea*. L. (Kosteletzky.) — *pratensis*. L. (Rufelsbad. Eisenstein.) — *verticillata*. L. vom Hrn. Bayer ist *S. pratensis*. L. Benesch. — *lanceolata*. Brouss. (Gerhard. Kosteletzky.) — *hispanica*. L. (Maly. Kosteletzky.) — *verticillata lampsanaefolia*. R. et S. (Prag. Benesch.) — *viridis*. L. (Kosteletzky.) — *coccinea*. L. (Hentschel.) — *nilotica*. Murray. (Mann.) — *Sambucus nigra*. L. (Prag. Chotek.) — *racemosa*. L. (Slawětín. Eisenstein. Bubenč. Moschner.) — *Sanguisorba officinalis*. L. (Euse. Moschner.) — *Sanicula europaea*. L. (Krumm. Jungbauer. Chlum. Moschner.) — *Santolina chamaecyparissias*. L. (Maly.) — *viridis*. W. (Mann.) — *Santvitalia procumbens*. W. (Reichenbach.) — *Saponaria officinalis*. L. (Chotek. Kaiserwiese. Opiz. Szawa. Moschner.) — *Vaccaria* L. vom Hrn. Jungbauer ist *S. officinalis*. L. Benesch. — *Satureja montana*. L. (Calabrien. Günther — Grabowsky.) — *hortensis*. L. (Mann. Maly.) — *Satyrion nigrum* L. (Geisberg. F. v. Braun. Hinterhuber.) — *Saxifraga aizoides*. L. (Hn-

tersberg. Braun.) — *androsacea*. L. (Untersberg. Hinterhuber. Lomler.) — *aphylla*. Sternb. (Grätz. Speckmoser.) — *burseriana*. L. (Untersberg. Hinterhuber.) — *decipiens* Ehrh. (St. Ivan. Kostelecky.) — *paradoxa*. Sternberg. (Grätz. Speckmoser.) — *stellaris*. L. (Untersberg. Bartenstein. Heubachthal. Lomler.) — *tridactylites*. L. (Scharfa. Moschner.) — *bryoides*. L. (Pasterze. Lomler. Heiligenblut. Bartenstein.) — *caesia*. L. (Grätz. Speckmoser.) — *granulata*. L. (Prag. Moschner.) — *Hirculus*. L. (Salzburg. Bartenstein.) — *moschata*. Wulf. (Schneeberg. Praesens.) — *mutata*. L. (Mariazell. Hölzel.) — *sedoides*. L. (Kalbsing. Sommerauer.) — *autumnalis*. L. (Heiligenblut. Bartenstein. Schneeberg. Praesens.) — *umbrosa*. L. (Mann.) — *Scabiosa canescens*. W. et K. Prag. Kostelecky. Leipzig. Gerhard.) — *dichotoma*. Ucria (Gerhard.) — *graminifolia*. L. (Günther.) — *atropurpurea*. L. (Mann.) — *Scandix Pecten*. L. (Gaya. Carl.) — *odorata*. (Schlesien. Grabowsky.) — *Scheuchzeria palustris*. L. (Schlesien. Grabowsky.) — *Schuhria abrotanoides*. Roth (Günther. Kostelecky.) — *Schönus nigricans*. L. (Ostfriesland. Weihe. Schweiz. Groh. Norderneg. Driburg. Weihe.) — *compressus*. L. (Elbe. Kostelecky.) — *Schollera oxycoccus*. (Jser. Petters. Cöln. Sehlmeier. Hohenfurth. Nenning. Georgswald. Neumann.) — *Scilla amöna*. L. (Kostelecky.) — *bifolia*. L. (Prater. Erxleben. Salzburg. Hinterhuber.) — *Scirpus campestris*. Roth. (Minden. Weihe.) — *costatus*. Presl. (Prag. Kostelecky.) — *maritimus*. L. (Prag. Kostecky.) — *maritimus compactus*. Hoffm. (Eisenach. Thon. Böhme. Mann.) — *radicans*. Schkuhr. (Schöschter. Gerhard. Sučap. Berchtold.) — *caespitosus*. L. (Sudeten. Eisenstein.) — *sylvaticus*. L. (Chotek.) — *Scleranthus annuus*. L. (Prag. Mann.) — *perennis*. L. (Prag. Eisenstein.) — *Scolymus maculatus*. L. (Kostelecky.) — *Scorpiurus vermiculata*. L. (Maly.) — *Scorzonera octangularis*. Roth. (Prag. Mann.) — *Scrophularia nodosa*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Scutellaria galericulata*. L. (Obřístvy. Eisenstein.) — *Scrophularia cordata*. Miller. (Szántó. Lang.) — *Scutellaria grandiflora*. Sims. (Günther.) — *peregrina*. L. (Mann.) — *albida*. L. (Braun.) — *hastifolia*. L.

(Oestreich. Reinegger. Leipzig. Gerhard.) — *Secale cereale* aestivum, (Bayer.) — *cereale hybérnum*, (Bayer.) — *Sedum* acre, L. (Prag. Mann.) — album, L. (Prag. Benesch.) — atratum, L. (Mariazell. Hölzel.) — dasyphyllum, L. (Grätz. Speckmoser.) — rupestre, L. (Prag. Mann.) — stellatum, L. (Kosteletzky.) — *Cepeae*, L. (Kosteletzky.) — *Telephium*, L. (Prag. (Kosteletzky.) — *Seiridium* graminicollum, Opiz, (auf Triticum um Prag. Benesch.) — *Selago* corymbosa, L. (Maly.) — *Selinum* palustre, vom Herrn Hölzel ist *Chaerophyllum hirsutum*, Grabowsky. — *Sempervivum* montanum, L. (Grätz. Speckmoser.) — monanthos, Aiton. (Braun.) — *Senebiera* Coronopus, Pers. (Prag. Kosteletzky.) — didyma, Pers. (Kosteletzky.) — *Senecio* abrotanifolius, L. (Kaisling. Sommerauer.) — carniolicus, W. (Eirfniz. Bartenstein. Kärnthén. Lomler.) — elegans flore pleno, (Huzelmann.) — montanus, W. (Mariazell. Hölzel.) — paludosus, L. (Böheim. Mann. Berlin. Schlechtendahl.) — viscosus, L. (Schlesien. Grabowsky.) — ovatus, H. Wetter. (Mainz. Ziz.) — saracenicus, L. (Prag. Mann. Duffniz. Chotek.) — sylvaticus, L. (Prag. Kosteletzky.) — artemisiaefolius P. (Braun.) — elegans, L. (Kosteletzky.) — *Serapias* latifolia, L. (Böhmischweide. Prochaska.) — *Seriola* äthnensis, L. (Walter. Kosteletzky. Maly.) *Serratula* cyanoides, Gaertner. (Gastorf. Neumann.) — tinctoria, L. (Prag. Kosteletzky.) — alata, W. (Weihe.) — *Seseli* glaucum, Linn. (Hornung. Prag. Mann.) — leucospermum, W. K. (Adlersberg. Lang.) — montanum, L. (Speckmoser.) — annuum, L. (Prag. Kosteletzky.) — *Hippomarathrum*, L. (St. Ivan. Opiz. Prag. Kosteletzky.) — dubium, Schkuhr. (Berlin. Schlechtendahl.) — *Sesleria* coerulea, Ard. (Prag. Kosteletzky.) — *Setaria* geniculata, Hornem. (Weihe.) — setosa, Swarz. (Kosteletzky.) — verticillata, (Prag. Mann.) — viridis, (Prag. Kosteletzky.) — *Sherardia* arvensis L. (Prag. Kosteletzky.) — *Sida* triangularis, H. et B. (Kosteletzky.) — abutilon, L. (Mann.) — Dilleniana, W. (Walter.) *Sideritis* nigricans, Lam. (Kosteletzky.) — hyssopifolia, (Braun.) — scor-dioides, L. (Braun.) — *Siebera* argentea, Hoppe. (Kirschbaumer. alpe. Braun.) — *Silene* armeria, L. (Kosteletzky.) — bipar-

tita. Desf. (Kosteletzky.) — gallica. L. (Mähren. Carl.) — nemoralis. W. et K. (Weihe. Dresden. Bauer. Prag. Kosteletzky.) — cretica. L. (Moschner.) — longiflora. Ehrh. (Ofen Lang.) — pendula. L. (Hentschel. Chotek.) — quinquevulnera L. (Kosteletzky.) — acaulis. L. (Untersberg. Braun. Hinterhuber.) — livida. W. (Weihe.) — amoena. Aiton. (Speckmoser.) — obtusifolia. W. (Kosteletzky.) — nutans. L. (Nesstod. Opiz.) — Otites. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Sinapis* hybrida. (Moschner.) — integrifolia. W. (Kosteletzky.) — alba. L. (Kosteletzky.) — foliosa. W. (Walter.) — *Sison* Anisum. Sprengl. (Masner.) — Podagraria. Sprengl. (Baumgarten. Masner.) — *Sisymbrium* murale. L. (Grätz. Speckmoser.) — palustre. L. vom Hrn. M. G. Ritter von Eisenstein ist *S. sylvestre* Lippicense. Mann. — taraxacifolium. Desf. (Kosteletzky.) — Amphibium. L. (Prag. Eisenstein.) — Löselii. L. (Prag. Moschner.) — Sophia L. (Prag. Kosteletzky.) — tenuifolium. L. (Prag. Kosteletzky.) — hirsutifolium. L. (Eisenstein.) — stoloniferum. Presl. (Brandeis. Mann.) — eckartsbergense. Willd. (Eckartsberg. Gerhard.) — contortum. Desfont. (Weihe.) — *Sium* Bulbocastanum. Sprengl. (Mainz. Ziz.) — Falcaria. L. (Böhmischaicha. Prochaska.) — latifolium. L. (Bohdaneč. Mann. Regensburg. Fürnrohr.) — *Solanum* fontanesianum. Dun. (Kosteletzky.) — guinense. Lam. (Kosteletzky.) — judaicum. Kit. (Kosteletzky.) — Pseudocapsicum. L. (Maly.) — Dulcamara. L. (Prag. Moschner.) — tuberosum. L. (Bayer.) — radicans. L. fil. (Kosteletzky.) — *Soldanella* alpina. L. (Schneeberg. Reinegger.) — minima. Hoppe. (Grätz. Speckmoser.) — *Solidago* alpestris. W. et K. (Böhmischaicha. Prochaska. Salzburg. Hinterhuber.) — *Virga aurea*. L. (Neuhof. Chotek.) — fragrans. W. (Günther.) — gigantea. Ait. (Speckmoser.) — mexicana. L. (Chotek.) — rigida. L. (Walter.) — canadensis. L. (Hentschel.) — procera. Aiton. (Speckmoser.) — *Solorina* saccata. Ach. (St. Jvan. Mann.) — *Sommerauera* quadrifaria. Hoppe. (Kaltling. Sommerauer.) — *Sonchus* oleraceus asper. L. (Prag. Kosteletzky.) — tenerrimus. L. (Moschner. Kosteletzky.) — alpinus. L. (Salzburg. F. v. Braun.) — lacerus. W. (Mosch-

ner. vom Hrn. M. C. Kostelecky ist *S. arvensis*. L. Grabowsky.
 — *Solanum nigrum*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sonchus ar-*
vensis. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sorbus lanuginosa*. Kit. (Žiž-
 faberg. Masner.) — *Aria*. Cranz. (Žižfaberg. Benesch.) —
aucuparia. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sparganium natans mi-*
nus. (Erfurth. F. v. Braun.) — *Spartina cynosuroides*. W.
 (Günther.) — *Spartium Scoparium*. L. (Prag. Kostelecky.) —
Spathularia flavida. (Stirin. Sykora. Maly.) — *Spergula ar-*
vensis. L. (Böhmischaida, Prochaska.) — *nodosa*. L. (Da-
 fflic. Mann.)

Ich ersuche die Herrn Abnehmer nichts anzubieten,
 als was sie im Bestellungsfall auch einliefern wollen, — von
 keiner bestellten Pflanze mehr als 25 Exemplare einzusenden,
 und die Exemplare so zu legen, daß sie leicht abgezählt wer-
 den können. Jenen Herrn Abnehmern werde ich übrigens
 bei Bestellungen den meisten Vorzug geben, welche für rich-
 tige, critische Bestimmung, sorgfältige Wahl der Exempla-
 re, gehörige Ausbreitung ihrer Theile, und elegante Trock-
 nung der eingelegten Pflanzen Sorge tragen, und übrigens
 auch das Bestellte am schnellsten einliefern. Schlußlich
 ersuche ich auch das botanische Publikum auf diese gün-
 stige Gelegenheit, die Herbarien schnell zu vervollständigen
 aufmerksam zu machen, und versichert zu seyn, daß derje-
 nige, welcher sein alphabetisches Herbarsverzeichnis einsen-
 det, und alles nimmt, was dieses nicht aufzählt, jeder Zeit
 mit neuen Pflanzen versorgt werden kann, und gegen die
 andern Herrn Abnehmer wesentliche Vortheile genießen wird.

Auf diese Art kann ich auch Sammlungen von Insek-
 ten, und Schmetterlingen verschaffen, nämlich 1 Centurie der
 Erftern um 2 fl. C. M. und der Letztern um 4 fl. C. M. nebst
 Vergütung der Emballage, Transports und Brieffkosten.

Prag, den 3. Dezember. 1823.

P. M. Spiz.

Corresp. Mitglied der k. k. Mährisch-schlesischen
 Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues,
 der Natur- und Landeskunde, und Mitglied der
 Gesellschaft des böhmischen, vaterländischen
 Museums.